



¿Podés hacer algo para evitar el cáncer?

El control de estos factores de riesgo se encuentra a tu alcance. Prestales atención.

Sobrepeso, Sedentarismo, tabaquismo, alto consumo de alcohol

Estas claves son centrales para proteger tu salud y la de tu familia.

Obra Social del Personal de Aeronavegación de Entes Privados RNOS N° 100601

Venezuela 900 (C1095AR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel-Fax: 4331-1411 (Líneas rotativas)

Fax: 4331-1421 info@ospadep.com

www.ospadep.com

Programas de Prevención

OSPADEP

Superintendencia de Servicios de Salud - Órgano de Control | 0800-222-SALUD (72583) www.sssalud.gob.ar



Salud de la mujer

Accioná por tu salud

Cáncer de cuello uterino



OSPADEP

Prevenir el CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

El cáncer cérvicouterino puede detectarse muy a tiempo. Se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello de útero causado en su mayoría por algunos tipos de Virus de Papiloma Humano (VPH).

Se estima que desde que se produce una lesión hasta que se desarrolla un cáncer en el cuello del útero **pasan de 10 a 20 años**. Por este motivo el cáncer de cuello de útero es una enfermedad **altamente prevenible**.

En cuanto al VPH, es un virus muy común, que afecta tanto a varones como a mujeres y que se transmite por contacto sexual.



El riesgo aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años. Es importante que lo realicen las mujeres luego de la menopausia.

Cómo detectarlo

El PAP (papanicolau)

Un estudio sencillo que detecta lesiones en el cuello del útero causadas por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano). Permite tratarlas antes de que se conviertan en cáncer.

Se recomienda que se realicen este estudio las mujeres a partir de los 25 años. Si durante 2 años seguidos el PAP da negativo, se puede espaciar a 3 años.

El riesgo de desarrollar cáncer de cuello de útero aumenta con la edad y es mayor en las mujeres de más de 50 años, por eso es importante que lo realicen las mujeres luego de la menopausia.

La vacuna contra el VPH

Previene la infección de los VPH que causan aproximadamente el 80% de los casos de cáncer de cuello de útero. La vacuna es gratuita y obligatoria para los niños de 11 años.

El test de VPH

El Test de VPH es una prueba que detecta la presencia de los tipos de VPH que pueden producir cáncer de cuello de útero.